

Injektions-Lipolyse Praxiskurs Komplikationen



Injektions-Lipolyse Praxiskurs Komplikationen




Umgang mit Nebenwirkungen

- Die meisten Nebenwirkungen sind harmloser Natur und der Patient kann fast immer beruhigt werden.
- Seien Sie für Ihre Patienten **telefonisch erreichbar**. Sie geben ihm dadurch ein Gefühl der Sicherheit.
- Die Einnahme 1 Tablette eines Schmerzmittels für denselben Abend hat sich bewährt.
- **Pain & Side Effect Management (PSM) unbedingt anwenden.**




Lipolyse Report 2015*



*Beantwortet von 4 % der Mitglieder



Lipolyse Report 2015




ca. 74.000 Behandlungen



Lipolyse Report 2015

Komplikationen: Haben Sie dauerhafte Hautschäden nach der Behandlung festgestellt?



Gefahr von Komplikationen

- Alle genannten Komplikationen sind voll reversibel!
- 2 Ausnahmen (bedingte Reversibilität):
 - Abszesse / Risiko 1 auf 12.500 Behandlungen
 - Nekrosen / Risiko 1 auf 25.000 Behandlungen



Sind nicht reversible Komplikationen vermeidbar?

- Abszesse:
 - Sorgfältige Desinfektion vor und nach der Behandlung (Octenisept, Kodan)
 - Patient sollte für die behandelte Stelle ein frisch gewaschenes Kleidungsstück mitbringen



Sind nicht reversible Komplikationen vermeidbar?

- Nekrosen 1: **Patientenhinweise**
 - Patient sollte weite Kleidung tragen
 - Keine Reibung (z.B. Sport) an der behandelten Stelle
 - Lange Autofahrten nur mit unterbrochenen Spaziergängen
 - Täglich eine halbe Stunde moderate Bewegung zur Förderung der Durchblutung



Sind nicht reversible Komplikationen vermeidbar?

- Nekrosen 2: Selektion
 - Lipolyse post Liposuktion: **Gefahr einer Nekrose** bei Injektion in Narbengewebe
 - Patienten mit
 - schwacher Mikrozirkulation
 - schlechter Durchblutungsind anfällig für Nekrosen, mit besonderer Vorsicht behandeln!



Post-Injektion



- Post-Injektions-**Hyperpigmentierungen** sind möglich
- Versuch der Entfernung mit Laser ist nicht zu empfehlen



Injektions-Lipolyse Praxiskurs Komplikationen



Physikalische, lokale Reaktion

(Urticaria Factitia)

nach 2 Stunden desselben Tages
verschwunden.



Injektions-Lipolyse Praxiskurs Komplikationen



Lokale allergische Reaktion

(nach 10-14 Tagen)

Einfach behandelbar

Antihistamine gel (Aerius, Tavegil oder Fenistil)

Evtl. zusätzlich Cortison Creme (Diproforte, Ultralan 30,0 + Doritin ad 100

Bei schwerer Reaktion extra Cortison (oral oder iv.) Tag 1: 100mg, Tag 2: 50 mg, Tag 3: 25 mg





Hinweise an den Patienten

- Weite Kleidung bei einer Körperbehandlung anziehen, evtl frisch gewaschene Kleidung mitbringen
- Nach der Behandlung: 30 Minuten Relaxing in der Praxis
- Während des 1. Tages
Viel Trinken! (stilles Wasser)
- Sonne oder Solarium während der ersten Woche meiden, zur Vermeidung von Hyperpigmentierungen
1 Monat Sunblocker
- Bei sportlicher Betätigung: ev. Mieder!